

## **NORME DI PREPARAZIONE**

### **ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA**

IL PAZIENTE È INVITATO AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE NORME RIPORTATE

SI CONSIGLIA UNA LEGGERA COLAZIONE.

PER L'ESAME FLUORANGIOGRAFICO È NECESSARIO PROVOCARE FARMACOLOGICAMENTE AGLI OCCHI DA ESAMINARE UNA COMPLETA MIDRIASI (DILATAZIONE DELLA PUPILLA). OGNI PAZIENTE HA TEMPI DI REAZIONE DIFFERENTI. L'OCULISTA, DOPO AVER ACCERTATO LA COMPLETA DILATAZIONE PUPILLARE, PUO' PROCEDERE ALL'ESAME FLUORANGIOGRAFICO O IN ASSENZA DI UNA VALIDA MIDRIASI PUO' SOSPENDERE L'ESAME. È OPPORTUNO ESSERE ACCOMPAGNATI PER I RISCHI DERIVANTI DALLA SOMMINISTRAZIONE DI COLLIRI CHE DILATANO LE PUPILLE E POSSONO ALTERARE LA CAPACITÀ DI GUIDARE AUTOVEICOLI.

PER ESEGUIRE L'ESAME È NECESSARIO PORTARE IL REFERTO DI UNA VISITA OCULISTICA IN CUI SONO INDICATE LE DIAGNOSI E LA RICHIESTA DI ANGIOGRAFIA RETINICA, INOLTRE LA PRESENZA DI PATOLOGIE SISTEMICHE (INSUFFICIENZA RENALE, EPATICA, GAMMOPATIE MONOCLONALI) O ALLERGIE CHE POSSONO CONTROINDICARE L'ESAME E' NECESSARIO AVERE REFERTO DI VISITE SPECIALISTICHE CHE SPECIFICHINO CHE L'ESAME PUO ESSERE ESEGUITO PER LE PROBLEMATICHE SOPRA CITATE.

PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME OCCORRE L'INTERA MATTINA.